

جلدي ساري ناروغي (سكبيز)



**د عفونت مځنيوی او کنترول
معلوماتي کتابچه**

جلدي ساري ناروغي (سکببیز)

سکببیز ناروغي عامه ده او هر چا ته لگیدلی شي. د دې درملنه باید په چټکۍ سره وکړل شي خو یې د خپریدو مخنیول وکړل شي.

وګورئ چې آیا دا سکببیز ناروغي ده

د دې علایم دا دي:

- سخت خارش، خصوصاً د شپې
- سرې او داغ یا پولی لرونکي دانې

د دانو دغه ځای سور ښکاریدي شي. په تور پوستکي د دې لیدل مشکل وي خو تاسو یې احساسولی شئ.



کوچني حشرات په پوستکۍ هگۍ اچولی شي، چې په یو سر کې د نقطې سره کرښې پریږدي.



دانې هر ځای راڅرګندیدي شي، خو معمولاً د ګوتو په منځ کې راڅرګندیږي.



دغه دانې بیا خپرېږي او د کوچنیو پولو په څیر ښکاري. دا په څرګند پوستکي سرې ښکاري.



دغه دانې په پوستکي تور داغونه پریږدي. دا په غنم رنگ پوستکي نصابي یا تور رنگ ښکاري.

جلدي ساري ناروغي (سکبیز)

سکبیز عموماً جدي ناروغي نه ده خو دا درملنې نه اړتيا لري.
د دې څخه نورې ناروغي جوړېږي لکه د جلد سخته ناروغي ايگزېما.

سکبیز له يو څخه بل ته په اسانۍ سره انتقالېږي خو دانې په بدن ښکاره کيدل تر
8 اوونيو پورې وخت اخیستلی شي او دا تشخیص کیدی شي.

د دانو په گړولو سره پوستکی سرایت کوي.

په دې ناروغي د اخته شوي ټول خلکو درملنه بايد
په ورته وخت وکړل شي، حتی د هغه کسانو هم
چې علايم نه لري.

جلدي ساري ناروغي (سکبیز)

خپريدل

په دې ناروغي د اخته ناروغ څخه:

د هغه کس سره مستقيم د پوستکي اړيکه چې د سکبیز ناروغي لري.

شاوخوا 10 دقيقې په دوام سره د پوستکو ترمنځ اړيکه.

حشرات د يو شخص څخه بل ته ټوپ نه وهي خو ولې په آرام يا تدريج سره د يو نه بل ته انتقالېږي کله چې پوستکي د بل پوستکي سره د لنډ وخت لپاره اړيکه ولري، د بيلگې په توگه، لاسونه ملاوهل، جنسي اړيکه.

د سکېبیز لپاره د درملنې پلان

د لومړۍ ورځې تداوی

د درملو لگولو دمخه مه لامبئ او شاور مه اخلئ.
لوشن/کریم باید په یخ پوستکي ولگول شي.

دا ډاډه کوئ چې ټول بدن مو پټ وي چې په دې کې د لاسو تلي، د پښو پونډې، د لاسو او پښو هغه نوکونه چې کټ شوې نه وي، غاړه، مخ، غوړونه او په سر کې د وینښانو سره پوستکي شامل دي.
تولیدوونکی ممکن د غاړې پورته د درملو لگولو سپارښتنه ونه کړي ما سوا د یو څو ځانگړي گروپونو څخه، مگر ماهرانه نظر دا دی چې د دغه ځای باید په ټول وضعینونو/تماسونو کې درملنه ترسره کړل شي. ښایي له یو ټیوب څخه زیات لوشن/کریمو ته اړتیا وي څو پوره بدن وپوښل شي.

که چیرې دغه کریم یا لوشن د بدن څخه لري شي، نو باید بیا ولگول شي، (د بیلگې په توگه، د لاسونو مینځلو یا تشناب استعمالولو پر وخت).

د درملنې وروسته باید کریم/لوشن د پوستکي څخه لرې کړل شي لکه څنګه چې تولیدوونکي لارښوونه کړې وي.

د شپې لگول (لږ تر لږه اته ساعته) زیات موثر وي، ځکه چې درمل به په ورځني فعالیتونو کې نه لږې کيږي.

د درملنې وروسته باید کریم/لوشن د پوستکي څخه لږې کړل شي لکه څنګه چې تولیدوونکي لارښوونه کړې وي. د درملنې وروسته د بستر څادرې او کالي ومینځئ.

ټول کارمندان باید په ورته 24 ساعته کې درملنه ترلاسه کړي.

د دویمې ورځې تداوی

د تداوي 7 ورځې وروسته د لومړۍ ورځې د تداوي

ټول اقدامات تکرار کړئ.

ټول په ورته 24 ساعتونو کې.

له مور سره اړیکه ونیسئ

د کرکلیس او وېکفیلډ عفونت د مخنیوي او کنټرول ټیم
برېښنالیک: infection.control@kirklees.gov.uk
تلیفون: 01484 221000



وېب سایټ
[www.kirklees.gov.uk/
infectioncontrol](http://www.kirklees.gov.uk/infectioncontrol)

د بریتانیې د روغتیا امنیتي اداره (UKHSA)
تلیفون: 0113 386 0300
د کاري ساعتونو نه بهر مشوره 0151 909 1219